

## Jak postępować po znalezieniu padłego dzika?

Jeżeli to możliwe, należy **oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika** w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby.

**Powstrzymać się od dotykania zwłok dzika** i pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok.

Należy **zgłosić fakt znalezienia padłego dzika** do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej, straży miejskiej, miejscowego koła łowieckiego lub powiadomić o tym fakcie starostę, burmistrza, wójta gminy, sołtysa wsi. W trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu).

### Należy pamiętać, że osoba, która:

- miała kontakt z dzikami na obszarach występowania ASF, po powrocie do domu **musi zastosować środki higieny ograniczające ryzyko szerzenia się ASF**, w tym odkazić ręce, starannie wyczyścić i zdezynfekować obuwie, a odzież przeznaczyć do prania;

- znalazła padłego dzika (i potencjalnie mogła mieć kontakt z wirusem ASF) **przez 72 godziny po tym fakcie nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świny i nie powinna wykonywać czynności związanych z ich obsługą.**

## Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich służb podejrzenia wystąpienia choroby – zakażenia wirusem ASF.

### Powiatowe Inspektoraty Weterynaryjne w województwie lubuskim:

PIW w Gorzowie Wlkp. – tel. 95 720 20 72  
PIW w Krośnie Odrzańskim – tel. 68 383 51 73  
PIW w Międzyrzeczu – tel. 95 741 22 38  
PIW w Nowej Soli – tel. 68 458 38 58  
PIW w Słubicach – tel. 95 757 60 56  
PIW w Strzelcach Krajeńskich – tel. 95 763 10 58  
PIW w Sulęcinie – tel. 95 755 00 40  
PIW w Świebodzinie – tel. 68 382 25 54  
PIW w Zielonej Górze – tel. 68 453 73 24  
PIW w Żaganiu – tel. 68 477 54 77  
PIW w Żarach – tel. 68 372 04 46  
PIW we Wschowie – tel. 68 356 51

### W przypadku znalezienia dzika zabitego w wypadku komunikacyjnym – dzwoń pod nr 997.

Opracowano na podstawie komunikatów:

Głównego Lekarza Weterynarii  
Głównego Inspektora Sanitarnego  
Wojewody Lubuskiego

przy współpracy z

Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa  
Rolniczego w Kalsku



Opracowanie merytoryczne, graficzne i redakcyjne:  
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kalsk 91, 66-100 Sulechów  
tel. 68 385 20 91, e-mail: [sekretariat@lodr.pl](mailto:sekretariat@lodr.pl)  
[www.lodr.pl](http://www.lodr.pl)

## INFORMACJA DLA WĘDKARZY

### AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ (ASF)



## PORADNIK OGÓLNY



### POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI OKRĘG W ZIELONEJ GÓRZE

ul. Bartosza Głowackiego 9  
65-301 Zielona Góra  
tel. 68 453 73 41  
e-mail: [pzw@pzw.zgora.pl](mailto:pzw@pzw.zgora.pl)  
[www.pzw.zgora.pl](http://www.pzw.zgora.pl)

## O chorobie ASF

Afrykański pomór świń (*African Swine Fever* – ASF) to szybko szerząca się, zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świny domowe, świniodziki oraz dziki. W przypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji. Zakażenie przebiega powoli i obejmuje znaczny odsetek zwierząt w stadzie, przy czym śmiertelność zwierząt sięga nawet 100%.

Przyjmuje się, że okres inkubacji choroby wynosi 15 dni (okres inkubacji w środowisku naturalnym: 4-19 dni, w przypadku choroby o ostrym przebiegu: 3-4 dni).

Wirus jest wyjątkowo odporny na działanie niskich temperatur i zachowuje właściwości zakaźne we krwi, kale, tkankach (zwłaszcza surowych, niedogotowanych produktów z mięsa wieprzowego lub dzików) przez okres nawet 3-6 miesięcy.

**Pamiętajmy, że wirus ASF jest odporny na warunki i w zależności od warunków przeżywa:**

- we krwi świń i dzików: 18 tygodni,
- w odchodach świń i dzików w temperaturze pokojowej: 60-100 dni,
- w surowym mięsie w temperaturze 4°C: 150 dni, a w mięsie mrożonym ok. 1000 dni,
- w szpiku kostnym: do 6 miesięcy, a w tkankach gnijących zwłok dzika lub świni przez 7-8 m-cy.

## Zagrożenie dla ludzi

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.

## Drogi zakażenia

Najczęstszym sposobem zakażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni kontakt ze zwierzętami zakażonymi. Rozprzestrzenianie się wirusa jest stosunkowo łatwe za pośrednictwem osób i pojazdów odwiedzających gospodarstwo, skażonego sprzętu i narzędzi, zwierząt mających swobodny dostęp do gospodarstwa (gryznie, koty, psy), jak również przez skażoną paszę, wodę oraz skarmianie zwierząt odpadami kuchennymi (zlewkami) zawierającymi nieprzetworzone mięso zakażonych świń lub dzików.

## Zagrożenia

Rozprzestrzenianie się wirusa ASF naraża producentów trzody chlewnej na poważne straty ekonomiczne. Zagroza bytowi wielu rodzinnych gospodarstw rolnych i może stanowić czynnik hamujący rozwój gospodarczy kraju.

## DROGI WĘDKARZU!

**PZW Okręg w Zielonej Górze zaleca:**

- **po zakończeniu wędkowania, zdezynfekuj środkiem biobójczym buty i ubranie;**
- **zdezynfekuj również koła samochodu;**
- **unikaj babrzysk, buchtowisk i innych widocznych miejsc, w których ostatnio przebywały dziki;**
- **jeśli podczas wędkowania towarzyszy Tobie pies, nie spuszcza go ze smyczy;**
- **zaniechaj zbędnego wchodzenia do lasu.**

**Zabrania się pozostawiania po sobie jakichkolwiek odpadków żywnościowych.**

## Jak rozpoznać afrykański pomór świń?

Objawy afrykańskiego pomoru świń mogą być niespecyficzne, podobne do innych chorób lub zatruc, mogą być różne w różnych stadach. Następujące objawy zawsze powinny zaniepokoić hodowcę:

- **nagłe padnięcia świń** – ASF w stadzie świń może niekiedy objawić się jedynie nagłymi padnięciami, bez innych objawów towarzyszących;
- **wzrost wewnętrznej ciepłoty ciała** (do 40,5-42°C), któremu mogą nie towarzyszyć inne symptomy (gorączkujące świny mają czasem zachowany apetyt, poruszają się na ogół normalnie);
- **inne objawy kliniczne, które mogą dołączyć do gorączki:**
  - **sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała,**
  - **drobne, lecz liczne wybroczyny w skórze,**
  - **zaczernienie skóry widoczne zwłaszcza na końcach uszu, ogona i kończynach,**
  - **duszność,**
  - **pienisty wypływ z nosa,**
  - **wypływ z worka spojówkowego,**
  - **biegunka** – często z domieszką krwi,
  - **wymioty,**
  - **niedowład zadu,**
  - **objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek mięśni i skurczów kloniczno-tonicznych,**
  - **ronienia u prośnych macior;**
- **niekiedy gorączce mogą towarzyszyć** posmutnienie, utrata apetytu, szybkie i trudne oddychanie oraz zaleganie wydzieliny z nosa i oczu, wymioty, zaparcia, krwista biegunka, przed śmiercią może nastąpić śpiączka, która pojawia się od jednego do siedmiu dni po wystąpieniu pierwszych objawów klinicznych.